

Gießener Früherkennungsschema I

– Die erste Stunde nach der Geburt

Zeitpunkt der Beurteilung	Beurteilte Kriterien	Punkte	
1.-2. Minute nach der Geburt	Lage und Situation unmittelbar nach der Geburt... <ul style="list-style-type: none"> • Erhobener Kopf, Brustlage, regelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) 	3	
	<ul style="list-style-type: none"> • Seitenlage, regelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) 	2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Seitenlage, unregelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen) 	1	
Bis 30 Minuten nach der Geburt	Lage und Situation... <ul style="list-style-type: none"> • Erste Aufstehversuche 	3	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verharren in Brust- oder Seitenlage 	2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verharren in Brust- oder Seitenlage und Krampfanfälle 	1	
Bis 60 Minuten nach der Geburt	Lage und Situation... <ul style="list-style-type: none"> • Sicheres Stehen, erster Euterkontakt 	3	
	<ul style="list-style-type: none"> • Unsicheres Stehen, häufiges Liegen, Kopf jedoch angehoben 	2	
	<ul style="list-style-type: none"> • Verharren im Liegen (Seitenlage, abgestützter Kopf) 	1	
Gesamtpunktzahl der Bewertung:			
Vitales Fohlen: <u>8 – 9 Punkte</u> → Kein Tierarzt erforderlich Gefährdetes Fohlen: <u>6 – 7 Punkte</u> → Tier erneut kontrollieren; ggf. Tierarzt Hochgradig gefährdetes Fohlen: <u>< 6 Punkte</u> → Tierarzt <u>sofort</u> informieren!!!			

(Aus „Der Praktische Tierarzt 95, Heft 3 (2014)“ Seite 247)

Gießener Früherkennungsschema II

– Die 2. – 24. Stunde nach der Geburt

Zeitpunkt der Beurteilung	Beurteilte Kriterien	Punkte	
Ab einer Stunde nach der Geburt aufwärts	1. Stehvermögen • Erhobener Kopf, Brustlage, regelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen)	3	
	• Seitenlage, regelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen)	2	
	• Seitenlage, unregelmäßige Atmung (Maulspalte geschlossen)	1	
Regelmäßig kontrollieren	2. Körpertemperatur °C • 38,0 - 39,2	3	
	• > 39,2 (z.B. Sepsis / Infektion)	2	
	• < 38,0 (niedrige Energieversorgung)	1	
8 h nach der Geburt	3. Mekoniumabgang • Bis 8 h nach der Geburt, dann Milchkot	3	
	• Geringe Mengen, häufiges Pressen, zunehmende Unruhe	2	
	• Kein Kotabsatz beobachtet, häufiges Pressen, Unruhe	1	
Regelmäßig kontrollieren	4. Harnabsatz • Im Strahl, ausreichende Menge	3	
	• Häufiger Harndrang, Absatz kleiner Mengen oder Tropfen	2	
	• Kein Harnabsatz beobachtet	1	
Regelmäßig kontrollieren	5. Atmung • Regelmäßig, gleichmäßig	3	
	• Unregelmäßig	2	
	• Stoßweise oder flach, geblähte Nüstern	1	
Regelmäßig kontrollieren	6. Kontakt zur Mutterstute • Regelmäßiger Kontakt, Aufsuchen des Euters, Sauggeräusche	3	
	• Erheblicher Abstand zur Mutter, kaum oder abnehmender Euterkontakt	2	
	• Umherirren ohne Mutterkontakt, kein Aufsuchen des Euters	1	
Gesamtpunktzahl der Bewertung:			
<p>Vitales Fohlen: 18 Punkte → Kein Tierarzt erforderlich Gefährdetes Fohlen: 15-17 Punkte → Tier erneut kontrollieren; ggf. Tierarzt Hochgradig gefährdetes Fohlen: < 15 Punkte → Tierarzt <u>sofort</u> informieren!!!</p>			

(Aus „Der Praktische Tierarzt 95, Heft 3 (2014)“ Seite 248)